鉄人会は頑張る君の味方です！

6 月 度

G n o R e v 実 力 確 認 テ ス ト

予 想 問 題

6 年

算 数

解 答 ・ 解 説

中学受験専門プロ家庭教師

中学受験鉄人会

家庭教師は必ず体験してから決めましょう！

解 答

① (1) 8 (2) $5\frac{3}{4}$ (5.75) (3) 600 (枚) (4) 1500 (m) (5) 1100 (m)

② (1) 32 (cm) (2) 17 (通り) (3) 18 (個) (4) 595 (個)
(5) 5 (個)、15 (個) (6) 43 (票以上)

③ (1) $\frac{7}{16}$ (倍) (2) 384 (cm³) (3) 6 (秒後) と 14.5 (秒後)
(4) X 18、Y 16 (5) 984 (cm³)

④ (1) 1 (時間) 59 (分後) (2) (ロボット) P、3 (時間) 43 (分後)

⑤ (1) 30 : 19 (2) 19 (cm²) (3) 9.5 (cm²)

⑥ (1) 18 (cm)、180 (cm²) (2) 210 (cm²) (3) $23\frac{1}{3}$ (秒後)

⑦ (1) 9 (cm) (2) 36 (3) 30 (分)

配 点 150 点満点

① 5 点×5 ② 5 点×6 ③ 5 点×5 ④ 6 点×2 ⑤ 6 点×3

⑥ (1) 5 点×2、(2)(3) 6 点×2 ⑦ 6 点×3

※②(5)、③(3)(4)、④(2)はすべてできて得点

解 説

① 《計算問題・小問集合》

(3) 最初にあった赤色の紙の枚数を⑧枚、青色の紙の枚数を③枚とすると、以下の式が成り立ちます。

$$(\textcircled{8} - 90) : (\textcircled{3} - 21) = 5 : 2$$

ここから式を進めます。

$$(\textcircled{8}) - 90 \times 2 = (\textcircled{3}) - 21 \times 5$$

$$\textcircled{16} - 180 = \textcircled{15} - 105$$

$$\textcircled{16} - \textcircled{15} = 180 - 105$$

$$\textcircled{1} = 75$$

より、 $\textcircled{1} = 75$ となるため、最初にあった赤色の紙の枚数は、

$$75 \times 8 = 600 \text{ (枚)}$$

より、600枚です。

(4) 時速 3.6km は、

$$3.6 \times 1000 \div 60 = 60 \text{ (m/分)}$$

より、分速 60m です。

春子さんと姉が同じ道のりを進む時間の比は、

$$\frac{1}{60} : \frac{1}{75} = 5 : 4$$

より、5 : 4 となります。

この比の差の 1 が、(午前 9 時 5 分 - 午前 9 時) = 5 分に当たるため、春子さんが家から学校まで進む時間は、

$$5 \times 5 = 25 \text{ (分)}$$

より、25 分となります。

よって、家から学校までの道のりは、

$$60 \times 25 = 1500 \text{ (m)}$$

より、1500mです。

(5) 夏子さんが冬子さんと出会った地点を C、冬子さんに追いつかれた地点を D とすると、A 地点から C 地点までの道のりは、

$$60 \times 5 = 300 \text{ (m)}$$

より、300m となり、C 地点から D 地点までの道のりは、

$$60 \times 6 = 360 \text{ (m)}$$

より、360m となります。

2人が進んだ様子は右の図のように
なるため、冬子さんはC地点で夏子
さんと出会ってからA地点について
折り返して、D地点に行くまで、

$$300 + 300 + 360 = 960 \text{ (m)}$$

より、960mを6分で走ったことに
なるため、冬子さんの速さは、

$$960 \div 6 = 160 \text{ (m/分)}$$

より、分速160mとなります。

B地点からC地点までは、冬子さんが5分をかけて進んだため、その道のりは、

$$160 \times 5 = 800 \text{ (m)}$$

より、800mとなります。

よって、A地点からB地点までの道のりは、

$$300 + 800 = 1100 \text{ (m)}$$

より、1100mです。

② 《小問集合》

(1) 時速12kmで40分走った距離であるため、

$$12 \times \frac{40}{60} \times 1000 \times 100 \times \frac{1}{25000} = 32 \text{ (cm)}$$

より、32cmです。

(2) 6の倍数は、3の倍数のうち偶数のものです。

まず、3の倍数になる3枚のカードの組み合わせを考えると、以下の4通りとなります。

(0、4、8)、(0、6、9)、(4、6、8)、(4、8、9)

それぞれについて、3けたの偶数が何個できるか考えます。

・ (0、4、8) の場合

480、840、804、408 の4通り

・ (0、6、9) の場合

690、960、906 の3通り

・ (4、6、8) の場合

684、864、486、846、468、648 の6通り

・ (4、8、9) の場合

894、984、498、948 の 4 通り

以上より、3けたの6の倍数は全部で、

$$4+3+6+4=17 \text{ (通り)}$$

より、17通りできます。

(3) 右の図のように、中空方陣を4つの長方形に分けると、1つの長方形にはおはじきが、

$$224 \div 4 = 56 \text{ (個)}$$

より、56個あります。

図の□個は、

$$56 \div 4 = 14 \text{ (個)}$$

より、14個となるため、外側の1辺に並ぶおはじきの個数は、

$$14+4=18 \text{ (個)}$$

より、18個です。

(4) 黒の正三角形は1段目に1個、2段目に2個、3段目に3個、…というように並び、それぞれの段に必要な個数は1個ずつ増えていきます。

よって、34段目まで並べるとき、黒の正三角形は全部で、

$$1+2+3+\dots+32+33+34=(1+34) \times 34 \div 2=595 \text{ (個)}$$

より、595個必要です。

(5) ケーキAの個数をa個、ケーキBの個数をb個とすると、以下の式が成り立ちます。

$$252 \times a + 280 \times b = 4900$$

式の両辺を28で割ると、

$$9 \times a + 10 \times b = 175$$

となります。

この式を満たすaとbの組み合わせを考えると、a=5、b=13が成り立ちます。

ここから、aを10増やして、bを9減らしても式が満たされますので、当てはまるaとbの組み合わせを、(a、b)とすると、

$$(5, 13)、(15, 4)$$

となります。

よって、考えられるケーキAの個数は、5個、15個です。

(6) 投票日当日に投票される票数は、

$$115 - 33 = 82 \text{ (票)}$$

より、82票となります。

この82票について、前日投票までの上位2位までにいるPとQで分けて接戦になる場合を考えます。

QがPと得票数で並ぶためには、

$$14 - 12 = 2 \text{ (票)}$$

より、2票が必要です。

残りの、 $(82 - 2 = 80)$ 票をPとQで分け合うと、

$$80 \div 2 = 40 \text{ (票)}$$

より、40票となり、これを加えた、

$$14 + 40 = 54 \text{ (票)}$$

より、54票では当選は確実にはなりません。

当選を確実にするためには、得票数の合計が、

$$54 + 1 = 55 \text{ (票)}$$

より、55票となる必要があるため、投票日当日にQが必要な票数は、

$$55 - 12 = 43 \text{ (票)}$$

より、43票以上です。

③ 《小問集合・図形》

(1) 三角形OBCの面積は、平行四辺形ABCDの面積の $\frac{1}{4}$ 倍です。また、三角形OBEの面積は平行四辺形ABCDの面積の、

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{1+3} = \frac{3}{16} \text{ (倍)}$$

より、 $\frac{3}{16}$ 倍となります。

よって、四角形OEBCの面積は、平行四辺形ABCDの面積の、

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16} \text{ (倍)}$$

より、 $\frac{7}{16}$ 倍です。

(2) 三角形 OAD と三角形 OCB は相似となり、相似比は、

$$AD : CB = 18 : 30 = 3 : 5$$

より、3 : 5 となります。

三角形 OAD と三角形 OCB の面積比は、

$$(3 \times 3) : (5 \times 5) = 9 : 25$$

より、9 : 25 となることから、三角形 OAD

の面積を⑨、三角形 OCB の面積を②⑤とす

ると、 $AO : CO = DO : BO = 3 : 5$ より、三角形 OAB、三角形 OCD の面積はどちらも、

$$\textcircled{9} \times \frac{5}{3} = \textcircled{15}$$

より、①⑤となります。

よって、台形 ABCD の面積は、

$$90 \times \frac{9 + 15 + 25 + 15}{15} = 384 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、384 cm²です。

(3) 三角形 PBC の面積が 67.5 cm² になるとき、この三角形 PBC の底辺を BC としたときの高さは、

$$67.5 \times 2 \div 15 = 9 \text{ (cm)}$$

より、9cm となります。

よって、三角形 PBC の面積が 1 回目に 67.5 cm² になるのは、

$$9 \div 1.5 = 6 \text{ (秒後)}$$

より、6 秒後です。

また、三角形 PBC の面積が 2 回目に 67.5 cm² になるのは、PC の長さが、

$$15 \times \frac{9}{12} = \frac{45}{4} \text{ (cm)}$$

より、 $\frac{45}{4}$ cm になるときです。

それまでに点 P が進んだ長さは、

$$12+6+15-\frac{45}{4}=\frac{87}{4} \text{ (cm)}$$

より、 $\frac{87}{4}$ cm となるため、三角形 PBC の面積が 2 回目に 67.5 cm^2 になるのは、

$$\frac{87}{4} \div 1.5 = 14.5 \text{ (秒後)}$$

より、14.5 秒後です。

- (4) 水そうに水が注がれる様子を真正面から見て、長さとかかる時間をかき込むと右の図のようになります。

X は、上下の長方形の面積の割合から、

$$30 \times \frac{8+10}{8+10+12} = 18 \text{ (cm)}$$

より、18 となります。

Y は、横並びの 2 つの長方形の横の長さの割合から、

$$36 \times \frac{8}{8+10} = 16 \text{ (cm)}$$

より、16 となります。

- (5) 右の図のように、角 DAC を○、角 ACD を●とすると、○と●の角度の和が 90 度で、角 BCD が 90 度であることから、角 ACB = ○、角 CBA = ●となり、三角形 ACD と三角形 CBA が相似になります。

三角形 ACD において、AD の長さ と CD の長さの比は、

$$(\text{AD の長さ}) : (\text{CD の長さ}) = 32 : 24 = 4 : 3$$

より、4 : 3 であるため、CA の長さは、

$$30 \times \frac{4}{3} = 40 \text{ (cm)}$$

より、40cm となります。

よって、台形 ABCD の面積は、

$$24 \times 32 \div 2 + 30 \times 40 \div 2 = 384 + 600 = 984 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、984 cm³です。

〔4〕 《規則性》

(1) ロボット P は 1 往復するのに、

$$3+1=4 \text{ (分)}$$

より、4 分かかります。

30 個目の製品を機械 B に置き終えるのは、

$$4 \times (30-1) + 3 = 119 \text{ (分後)}$$

より、1 時間 59 分後です。

(2) ロボット Q は 1 往復するのに、

$$4+1=5 \text{ (分)}$$

より、5 分かかります。

ロボット P が 1 往復するのに 4 分かかることから、4 分と 5 分の最小公倍数である 20 分を 1 周期として、機械 B に製品が運ばれる時間をまとめると、下の図のようになります。

20 分間で 2 つのロボット合わせて 9 個の製品を機械 B に運ぶことから、最後に機械 B に運ばれる製品は、

$$100 \div 9 = 11 \text{ あまり } 1$$

より、12 周期目の 1 個目に運ばれるものとなります。

周期の中で 1 個目に運ばれる製品は、図より、ロボット P の 1 個目です。

また、それは、はじめに 2 つのロボットが同時に機械 A を出発してから、

$$20 \times 11 + 3 = 223 \text{ (分後)}$$

より、3 時間 43 分後です。

5 《拡大・縮小》

(1) (図1) で、三角形 AEG と三角形 CDG は相似となり、相似比は、

$$AE : CD = 1 : (1+4) = 1 : 5$$

より、1 : 5 であるため、 $AG : GC = 1 : 5$ となります。

同じように、三角形 AHD と三角形 CHF は相似となり、相似比は、

$$AD : CF = (3+1) : 1 = 4 : 1$$

より、4 : 1 であるため、 $AH : HC = 4 : 1$ となります。

AC の長さを 1 とすると、AG の長さは、

$$1 \times \frac{1}{1+5} = \frac{1}{6}$$

より、 $\frac{1}{6}$ となり、HC の長さは、

$$1 \times \frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$$

より、 $\frac{1}{5}$ となるため、GH の長さは、

$$1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{5}\right) = \frac{19}{30}$$

より、 $\frac{19}{30}$ となります。

よって、AC : GH は、

$$1 : \frac{19}{30} = 30 : 19$$

より、30 : 19 です。

(図1)

(2) 三角形 DAC と三角形 DGH は高さが等しいため、面積の比は底辺の比と等しく、(1) より、 $AC : GH = 30 : 19$ となります。

三角形 DAC の面積は、平行四辺形 ABCD の面積の半分となるため、

$$60 \div 2 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、 30 cm^2 であることから、三角形 DGH の面積は、

$$30 \times \frac{19}{30} = 19 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、19 cm²です。

(3) 三角形 AEG と三角形 CDG が相似となり、相似比が 1 : 5 であることから、EG : GD = 1 : 5 となります。

また、三角形 AHD と三角形 CHF が相似となり、相似比が 4 : 1 であることから、DH : HF = 4 : 1 となります。

よって、(図 2) の通り、三角形 DGH と三角形 DEF を比べると、三角形 DGH の面積は、三角形 DEF の面積の、

$$\frac{5}{5+1} \times \frac{4}{4+1} = \frac{2}{3} \text{ (倍)}$$

より、 $\frac{2}{3}$ 倍となるため、三角形 DGH と四角形 EFHG の面積の比は、

$$\frac{2}{3} : (1 - \frac{2}{3}) = 2 : 1$$

より、2 : 1 となります。

よって、四角形 EFHG の面積は、

$$19 \times \frac{1}{2} = 9.5 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、9.5 cm²です。

(図 2)

〔6〕《点の移動》

(1) 2 点が出発してから 2 秒間で、点 P は (2.5 × 2 =) 5cm、点 Q は (1 × 2 =) 2cm 進むため、三角形 PQC は (図 1) のようになります。

E、F がそれぞれ辺 AB、DC の真ん中の点であることから、ER の長さは、

$$(5 + 35) \div 2 = 20 \text{ (cm)}$$

より、20cm となります。

(図 1)

よって、QR の長さは、

$$20 - 2 = 18 \text{ (cm)}$$

より、18cm です。

また、三角形 PQC の面積は、QR を底辺とする三角形 PQR と三角形 CQR の面積の和で、2つの三角形の高さの和が 20cm になるため、その面積は、

$$18 \times 20 \div 2 = 180 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、180 cm² です。

(2) PC と EF の交点を R' とすると、三角形 PQC の面積は、底辺である QR' の長さが最も長くなる時に最大となります。

これは (図 2) のように、点 P が頂点 D についたとき (点 R' と点 F が重なったとき) で、2 点が出発してから、

$$35 \div 2.5 = 14 \text{ (秒後)}$$

より、14 秒後となります。

このとき、QR' の長さは、

$$35 - 1 \times 14 = 21 \text{ (cm)}$$

より、21cm となるため、三角形 PQC の面積は、

$$21 \times 20 \div 2 = 210 \text{ (cm}^2\text{)}$$

より、210 cm² です。

(図 2)

(3) (2) のときから 3 点 P、Q、C が一直線上に並ぶまでの 2 点の動きを考えると、(図 3) ようになります。

点 P と点 Q の速さの比は、

$$2.5 : 1 = 5 : 2$$

より、5 : 2 であるため、同じ時間で 2 点が進んだ長さの比も 5 : 2 となります。

これより、点 P が進んだ長さを 5、点 Q

が進んだ長さを 2 とすると、QF の長さは、

(図 3)

$$\boxed{5} \times \frac{1}{2} = \boxed{2.5}$$

より、 $\boxed{2.5}$ となります。

$(35-14=)21\text{cm}$ が、 $(\boxed{2} + \boxed{2.5} =) \boxed{4.5}$ にあたることから、点 P が頂点 D から進んだ長さは、

$$21 \times \frac{5}{4.5} = \frac{70}{3} \text{ (cm)}$$

より、 $\frac{70}{3}$ cm となります。

よって、3 点 P、Q、C が一直線上に並ぶのは、2 点が出発してから、

$$14 + \frac{70}{3} \div 2.5 = 23\frac{1}{3} \text{ (秒後)}$$

より、 $23\frac{1}{3}$ 秒後です。

7 《水量グラフ》

(1) グラフより、水面の高さが 15cm から 30cm (仕切り板のない部分) になるまで、
 $20-10=10$ (分)

より、10 分かかることがわかります。

したがって、仕切り板がなかったとすると、水面の高さは 1 分間に、

$$(30-15) \div 10 = 1.5 \text{ (cm)}$$

より、1.5cm の割合で上がることとなります。

よって、仕切り板がなかったとすると、6 分後の水面の高さは、

$$1.5 \times 6 = 9 \text{ (cm)}$$

より、9cm です。

(2) グラフより、6 分後の A、B の部分の水面の高さはそれぞれ 15 cm、7.5cm となります。

(1)より、仕切り板がなかったとすると、水面の高さが 9cm になることから、仕切り板があったとしても、6 分間で注がれた水の量は、水そうの底面積に 9cm の高さ

をかけた体積となります。

よって、水そうを真正面から見た(図Ⅰ)で、㉠と㉡の部分の体積が等しくなります。

㉠の長方形のたての長さは、

$$15 - 9 = 6 \text{ (cm)}$$

より、6cmとなり、㉡の長方形のたての長さは、

$$9 - 7.5 = 1.5 \text{ (cm)}$$

より、1.5cmとなります。

これより、㉠の長方形と㉡の長方形の横の長さの比は、

$$\frac{1}{6} : \frac{1}{1.5} = 1 : 4$$

より、1 : 4となるため、㉢に当てはまる数は、

$$45 \times \frac{4}{1+4} = 36 \text{ (cm)}$$

より、**36**です。

(3) 水そうを真正面から見た(図Ⅱ)

で、グラフより、㉣の部分をつぱいにするのに6分かかるため、Bの部分にあるじゃ口だけで㉣の部分をつぱいにするのにも6分かかります。

㉣と㉤を合わせた部分の底面積と、㉥の部分の底面積の比は、(2)より4 : 1である

ため、㉥の部分の同じ高さ(15cm)まで水を入れるのに、

$$(6+6) \times \frac{1}{4} = 3 \text{ (分)}$$

より、3分かかります。

よって、この水そう全体の 15cm の高さまで水を入れるのに、

$$12+3=15 \text{ (分)}$$

より、15 分かかるため、B の部分にあるじゃ口だけでこの水そうをいっぱいにするには、

$$15 \times \frac{30}{15} = 30 \text{ (分)}$$

より、30分かかります。